



ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI

ZDRAVSTVENI DOM RADLJE VAS OBVEŠČA:

CEPLJENJE PROTI KLOPNEMU MENINGOENCEFALITISU ZA OSEBE STARE 49 LET, ROJENE V LETU 1970

Obveščamo vas, da bomo v skladu s Programom cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2019 (Uradni list RS, št. 26/19; str. 3294-3308) začeli s cepljenjem oseb starih 49 let (rojnih v letu 1970) proti klopnemu meningoencefalitisu.

Priporočljivo cepljenje se izvede s 3 odmerki cepiva.

Stroške cepiva za osebe, rojene v letu 1970, krije **obvezno zdravstveno zavarovanje**. Cepljenje proti KME opravi izbrani osebni zdravnik s cepivom **FSME-IMMUN 0,5 ml (Pfizer)**.

Po prejetih treh odmerkih v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja so nadaljnji odmerki samoplačniški.

Za osebe, rojene v letu 1970, ki so že prej „samoplačniško“ začeli s cepljenjem, se lahko v breme OZZ izvedejo trije naslednji odmerki.

Če se želite zaščititi proti klopnemu meningoencefalitisu, se oglasite v ambulanti izbranega zdravnika ali nas pokličite na telefonsko številko:

- 02 87 70 840 – ZA paciente SA VUZENICA ,
- 02 87 70 803 – ZA paciente SA RADLJE ,
- 02 87 70 814 – ZA paciente OTROŠKA RADLJE
- 02 87 69 507 – ZA paciente SA PODVELKA ,
- 02 88 80 277 – ZA paciente SA RIBNICA ,

da vam bomo podali potrebne informacije v zvezi s cepljenjem.

CEPIVO FSME-IMMUN 0,5 ml (Pfizer).

je inaktivirano (mrtvo) cepivo za cepljenje oseb starih 16 let ali več proti klopnemu meningoencefalitisu. Cepivo vsebuje inaktivirane viruse klopnega meningoencefalitisa sev Neudorfl in je pridobljeno v fibroblastih piščančjih zarodkov. Cepimo intramuskularno v deltoidna mišica na nadlahti. Cepimo lahko sočasno z drugimi cepivi v skladu z uradnimi priporočili (različna mesta, druga okončina).

SmPC (povzetek glavnih značilnosti zdravila) za cepivo FSME-IMMUN 0,5 ml lahko najdete na spletni strani Centralne baze zdravil (<http://www.cbz.si>).

KLOPNI MENINGOENCEFALITIS je resna virusna bolezen osrednjega živčevja, ki se prenaša z vbodom okuženega klopa. Prvi znaki bolezni se lahko pojavijo 7–14 dni po okužbi. Bolezen običajno poteka dvofazno. Prvo obdobje bolezni se kaže kot kratka neznčilna vročinska bolezen z mišičnimi bolečinami, utrujenostjo in glavobolom. Sledi obdobje brez simptomov, ki traja okrog 8 dni. Drugo obdobje bolezni se izraža z znaki prizadetosti osrednjega živčevja, kar lahko pušča dolgotrajne posledice (glavobol, utrujenost, motnje zbranosti, motnje spomina), včasih tudi trajne ohromitve (5 %) ali celo smrt (1 %).

ZDRAVSTVENI DOM RADLJE
Splošna zdravstvena služba